

## Нормальные сроки прорезывания молочных и постоянных зубов (для европеоидных популяций)

[Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. М., 1964.; Зубов А.А. Этническая одонтология. М., 1973. с доп.]

Зубы	Возрастные пределы	
	молочная смена	постоянная смена
<b>Резцы:</b>		
11, 21, 31, 41	6 – 8 месяцев	6 – 8 лет
12, 22, 32, 42	7 – 12 месяцев	7 – 9 лет
<b>Клыки:</b>		
13, 23, 33, 43	16 – 20 месяцев	10 – 14 лет
<b>Премоляры:</b>		
14, 24, 34, 44	нет	9 – 12 лет
15, 25, 35, 45	нет	11 – 13 лет
<b>Моляры:</b>		
16, 26, 36, 46	12 – 16 месяцев	6 – 7 лет
17, 27, 37, 47	20 – 30 месяцев	12 – 13 лет
18, 28, 38, 48	нет	17 – 22 (28) лет
<b>Порядок прорезывания</b>		
<b>верхняя челюсть</b>	i1, i2, m1, m2, c	M1, I1, I2, P1, P2, C, M2, M3
<b>нижняя челюсть</b>	i1, i2, c, m1, m2	M1, I1, I2, C, P1, P2, M2, M3

Филогенетически зубы человека принадлежат к **гетеродонтной** (различные по форме), **текодонтной** (укреплены в ячейках челюстей) системам, и к **дифиодонтному типу** (одна смена зубов).